



Просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию до того, как Вы начнете принимать лекарство. Она содержит важную для Вас информацию. Сохраните эту инструкцию с информацией по применению, так как позднее Вам может потребоваться прочитать ее еще раз. Для получения любой дополнительной информации или совета, пожалуйста, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту. Ваш врач выписал данный лекарственный препарат Вам лично. Вы не должны передавать его другим лицам. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания схожи с Вашими.

Торговое название препарата: Риноксил® КИДС

Действующее вещество (МНН): оксиметазолина

Лекарственная форма: спрей назальный 0,025%

Состав:

100 мл раствора содержит:
активное вещество: оксиметазолина гидрохлорид – 0,025 г;
вспомогательные вещества: эвкалиптовое масло, натрия дигидрофосфат дигидрат, динатрия эдетат (трилон Б), бензалкония хлорид (в виде раствора 50%), пропиленгликоль, раствор соляной кислоты 0.1М или раствор гидроксида натрия 0.1М, вода очищенная.

Описание: прозрачный, бесцветный или со слегка желтоватым оттенком раствор со специфическим запахом эвкалиптового масла.
Фармакотерапевтическая группа: средство для лечения заболеваний ЛОР-органов. Деконгестанты и другие назальные препараты для местного применения. Симптоматиетики.
Код АТХ: R01AA05

Фармакологические свойства

Альфа-адреномиметирующее средство для местного применения, оказывает сосудосуживающее и антиконгестивное действие. Оксиметазолин стимулирует α-адренорецепторы, вызывает сужение сосудов слизистых оболочек носа, придаточных пазух и евстахиевой трубы, что приводит к снижению их отека и освобождению носового дыхания при аллергическом и/или инфекционно-воспалительном рините (насморке). Эвкалиптовое масло обладает бактерицидным, антивирусным и фунгицидным действием.

Фармакокинетика

При местном применении оксиметазолин в незначительной степени подвергается системной абсорбции, поэтому его концентрация в плазме крови незначительна. Действие проявляется через несколько минут. Продолжительность действия 10-12 часов.

Показания к применению

Для уменьшения отека слизистой оболочки носа, носоглотки и гайморовых пазух при:

- простудных заболеваний (острый ринит);
- воспалении носовых пазух (острый синусит);
- евстахиите;
- аллергическом рините (в т.ч. сенная лихорадка);
- среднем отите (в качестве средства вспомогательной терапии, т.к. уменьшает отечность слизистой вокруг отверстия евстахиевой трубы).

Применяют также для облегчения осмотра или хирургической манипуляций в полости носа.

Информация о правильном применении

Способ применения и дозы

Всегда применяйте Риноксил® КИДС точно в соответствии с инструкцией Вашего лечащего врача. Если Вы в чем-либо не уверены, спросите у Вашего врача или фармацевта.

Назальный спрей.

Детям в возрасте от 2 лет до 6 лет следует назначать по 1 впрыскиванию в каждой носовой ход 2 раза/сутки. С осторожностью и под наблюдением врача. Рекомендуется последнюю аппликацию проводить непосредственно перед сном.

Непосредственно перед применением препарата флакон нужно подержать в ладони, чтобы подогреть его до температуры тела. Перед введением препарата необходимо тщательно прочистить нос.

Перед первым применением назального спрея необходимо провести его «калибровку» путем нажатия на головку распылителя несколько раз. Для того чтобы правильно сделать впрыскивание, следует держать распылитель вертикально, так, чтобы насадка была направлена вверх. Затем следует снять прозрачный предохранительный колпачок, поместить насадку в носовой ход, без риска надавить один раз на распылитель и вынуть из носового хода, не разжимая распылитель. Во время впрыскивания следует вдохнуть немного воздуха через нос, что способствует оптимальному введению раствора.

При впрыскивании не рекомендуется запрокидывать голову.
Продолжительность лечения: не рекомендуется применять препарат более 3-5 дней. Если симптомы усиливаются или улучшение не наступает в течение 3 дней, необходимо проконсультироваться с врачом.
Максимально допустимая продолжительность терапии – 5 дней. Препарат можно применять повторно только через несколько дней.

Побочные действия

Как и любой лекарственный препарат, Риноксил® КИДС может вызвать побочные реакции, хотя они проявляются не у каждого.

Ниже указаны побочные эффекты, которые разделены по системно-органным классам в соответствии с классификацией Медицинского словаря по нормативно-правовой деятельности (MedDRA). Для указания частоты встречаемости побочных эффектов была использована классификация ВОЗ: очень часто (≥10%), часто (≥1% и <10%), нечасто (≥0,1% и <1%), редко (≥0,01% и <0,1%), очень редко (<0,01%), неизвестная частота (по имеющимся данным определить частоту встречаемости побочного эффекта не представляется возможным).

Обычно Риноксил® КИДС переносится хорошо. При частом и/или длительном применении препарата возможны:

- **общие расстройства и нарушения в месте введения:** возможно - экзантема; часто - жжение или сухость слизистой оболочки полости носа, чиханье, сильное чувство заложенности носа (реактивная гиперемия) после того как пройдет эффект от применения препарата Риноксил® КИДС, нарушение зрения (при попадании в глаза). Длительное непрерывное использование сосудосуживающих препаратов может привести к тахифиликсии, атрофии слизистой оболочки полости носа и возвратному отеку слизистой оболочки полости носа (медикаментозный ринит);
 - **со стороны сердечно-сосудистой системы:** повышение АД, тахикардия; возможно - ощущение сердцебиения;
 - **со стороны нервной системы:** редко - головная боль, бессонница; возможно - головокружение, чувство тревоги, раздражительность, нарушение сна (у детей);
 - **со стороны пищеварительной системы:** возможно - тошнота.
- Если у Вас отмечаются любые другие побочные реакции, не описанные в этой инструкции, пожалуйста, сообщите Вашему врачу, фармацевту или производителю.

Информация, необходимая до начала применения лекарственного средства

Противопоказания

Гиперчувствительность к препарату, в том числе к другим препаратным средствам для интраназального применения; атрофический ринит; гипертроф, воспаление слизистой носовых ходов без выделения секрета, беременность, лактация, одновременное применение ингибиторов моноаминоксидазы (включая период 14 дней после их отмены), детский возраст до 2 лет.

С осторожностью: следует применять препарат при повышенном внутриглазном давлении, хронической почечной недостаточности, аритмии, гиперплазии предстательной железы с клиническими симптомами (задержка мочи), закрытоугольной глаукоме, выраженном атеросклерозе, заболеваниях коронарных артерий, феохромоцитоме, хронической сердечной недостаточности, сахарном диабете, артериальной гипертензии.

Лекарственные взаимодействия

Пожалуйста, сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что Вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, даже если они отпускаются без рецепта.

При одновременном назначении препарата с другими сосудосуживающими средствами (независимо от способа введения) возможно взаимное усиление побочных эффектов.

Оксиметазолин замедляет всасывание местноанестезирующих средств и пролонгирует их эффект.
При одновременном назначении ингибиторов МАО (включая период в течение 14 дней после их отмены) и трициклических антидепрессантов – повышение АД.

Особые указания

Следует избегать длительного применения и передозировки.

Пациентам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензии, гипертрофозом препарат назначают с осторожностью. Обычно при применении препарата Риноксил® КИДС в рекомендованных дозах для ликвидации симптомов ринита достаточно 3 дней. Если за этот период симптомы не исчезнут, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. При продолжительном применении (более одной недели) возможно возобновление симптомов заложенности носа. Максимально допустимая продолжительность терапии - 5 дней. Препарат можно применять повторно только через несколько дней. Необходимо избегать попадания препарата в глаза. Использование одного флакона несколькими лицами может привести к распространению инфекции. Флаконом должно пользоваться только одно лицо (при передаче инфекции).

Применение при нарушениях функции почек

Препарат следует применять с осторожностью при хронической почечной недостаточности.

Применение у детей

Следует избегать длительного использования и передозировки препарата у детей. Противопоказан в детском возрасте до 2 лет.

Применение при беременности и в период лактации

Если Вы обнаружили, что беременны во время применения препарата Риноксил® КИДС, немедленно сообщите об этом Вашему врачу, так как только он может решить вопрос о необходимости продолжения лечения. Безопасность препарата Риноксил® КИДС у беременных женщин и в период лактации не установлена, поэтому препарат не рекомендуется применять беременным или в период лактации.

Возможно применение препарата Риноксил® КИДС во время беременности и в период лактации по строгим показаниям только под постоянным врачебным контролем после тщательной оценки соотношения риска и пользы для матери и младенца. Не допускается превышать рекомендуемую дозировку.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

После длительного применения средств от насморка, содержащих оксиметазолин, в дозах, превышающих рекомендуемые, нельзя исключать общее влияние на сердечно-сосудистую систему и ЦНС. В этих случаях пациенты должны соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстрой психомоторных реакций. Препарат оказывает влияние на зрение, возможно снижение скорости реакции.

Передозировка

При приеме более высокой дозы, чем Вам назначено, немедленно обратитесь за помощью к врачу!

После значительной передозировки или случайного приема внутрь могут отмечаться такие симптомы: мигр, тошнота, рвота, цианоз, гипертермия, тахикардия, аритмия, сосудистая недостаточность, артериальная гипертензия, дыхательные расстройства, отек легких, остановка сердца. Кроме этого могут развиваться психические расстройства, а также угнетение функций ЦНС, которые сопровождаются сонливостью, снижением температуры тела, брадикардией, артериальной гипотензией, остановкой дыхания и возможным развитием комы.
Лечение: прекращение применения, симптоматическая терапия.

Форма выпуска

Спрей назальный 0,025% по 10, 15, 20 мл во флаконах с распылительным дозирующим устройством. Флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещается в картонную упаковку.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не замораживать.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптеки

Без рецепта врача.

Производитель/Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

ООО «НИКАРНАМ»,

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 7-проезд ул. Сайрам, дом 48-А.

Тел.: 998 78 150 868; факс: 998 78 150 848.

www.nikapharm.uz

