



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЭНТЕРОСГЕЛЬ®
ENTEROSGEL®

Торговое название препарата: Энтеросгель®.

Действующее вещество (МНН): полиметилсилоксана полигидрат.

Лекарственная форма: паста для приёма внутрь.

Состав:

100 г препарата содержат:

активное вещество: полиметилсилоксана полигидрат 70 г; (ПМС ПГ, продукт нелинейной поликонденсации 1,1,3,3-тетрагидрокси-1,3-диметилдисилоксана полигидрат);

вспомогательное вещество: вода очищенная 30 г.

Описание: однородная пастообразная масса от белого до почти белого цвета без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: Средство, применяемое при отравлениях и интоксикациях. (энтеросорбирующее средство: обладает выраженными сорбционным и детоксикационным свойствами).

Код АТХ: А07В.

Фармакологические свойства

Энтеросгель® имеет пористую структуру кремнийорганической матрицы (молекулярная губка) гидрофобной природы, которая характеризуется сорбционным действием по отношению только к среднемолекулярным токсическим метаболитам (м.м. от 70 до 1000). Энтеросгель® обладает выраженными сорбционным и детоксикационным свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая бактерии и бактериальные токсины, антигены, пищевые аллергены, лекарственные препараты и яды, соли тяжёлых металлов, радионуклиды, алкоголь. Препарат сорбирует также некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина и липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза. Энтеросгель® не уменьшает всасывания витаминов и микроэлементов, способствует восстановлению нарушенной микрофлоры кишечника и не влияет на его двигательную функцию.

Показания к применению

У взрослых и детей в качестве детоксикационного средства:

- острые и хронические интоксикации различного происхождения;
- острые отравления сильнодействующими и ядовитыми веществами, в том числе лекарственными препаратами и алкоголем, алкалоидами, солями тяжёлых металлов;
- острые кишечные инфекции любого генеза в составе комплексной терапии (токсикоинфекции, сальмонеллёз, дизентерия, диарейный синдром неинфекционного происхождения, дисбактериоз);
- гнойно-септические заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией, в составе комплексной терапии;
- пищевая и лекарственная аллергия;
- гипербилирубинемия (вирусные гепатиты) и гиперазотемия (хроническая почечная недостаточность);
- с целью профилактики хронических интоксикаций работникам вредных производств (профессиональные интоксикации химическими агентами политропного действия,

ксенобиотиками, инкорпорированными радионуклидами, соединениями свинца, ртути, мышьяка, нефтепродуктами, органическими растворителями, окислами азота, углерода, фторидами, солями тяжёлых металлов).

Способ применения и дозы

Энтеросгель® пасту принимают внутрь за 1-2 часа до или после еды, или приёма других лекарств, запивая водой.

Необходимое для приёма количество препарата рекомендуется размешать в стакане в тройном объёме воды комнатной температуры или принимать внутрь, запивая водой.

Дозировка для взрослых – по 1 столовой ложке (15 г) 3 раза в сутки (45 г).

Детям в возрасте до 5 лет – 1 чайная ложка (5 г) 3 раза в сутки (15 г), а от 5 до 14 лет – одна десертная ложка (10 г) 3 раза в сутки (30 г).

Для профилактики хронических интоксикаций – в сутки 30 г или в 2 приема по 15 г в течение 7-10 дней ежемесячно.

При тяжёлых интоксикациях в течение первых трёх суток доза препарата может быть увеличена вдвое.

Продолжительность лечения при острых отравлениях - 3-5 суток, а при хронических интоксикациях и аллергических состояниях - 2-3 недели. Повторный курс по рекомендации врача.

Побочные действия

Возможны тошнота, запор. При тяжёлой почечной и/или печёночной недостаточности возможно появление чувства отвращения к препарату.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость препарата, атония кишечника.

Лекарственные взаимодействия

Возможно уменьшение всасывания других препаратов при одновременном приёме с Энтеросгелем®.

Особые указания

Препарат может использоваться в комплексной терапии с другими лекарственными средствами при соблюдении правила раздельного во времени приёма 1-2 часа до или после приёма других лекарственных препаратов.

Применять по назначению врача.

Беременность и лактация

Энтеросгель® не противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Передозировка

Случаев передозировки не выявлено.

Форма выпуска

Паста для приёма внутрь в тубах из комбинированных материалов по 225 г или пакетах из материала комбинированного двухслойного на основе алюминиевой фольги и плёнки по 22,5 г. Каждую тубу по 225 г или 10 пакетов по 22,5 г вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не ниже 4°C и не выше 30°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Предохранять от высыхания после вскрытия упаковки. Беречь от замораживания.

Срок годности

3 года.

Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптеки

Отпускают без рецепта.

Производитель

ООО «ТНК СИЛМА»

399851, Россия, Липецкая обл., г.Данков, ул.Л.Толстого, д.32/2

Тел./факс: (495) 223-91-00, www.enterosgel.ru, e-mail: contact@enterosgel.ru

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ООО «NIKA PHARM»

Республика Узбекистан, г.Ташкент, 7-проезд ул. Сайрам, дом 48-А

Тел.: + 998 78 150 86 68