

РиноМакс®

**ОКСИ
КИДС**

3+

**Детям в возрасте от
3 до 6 лет**

**спрей назальный
Облегчает носовое дыхание
ИНСТРУКЦИЯ ПО
МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
«УТВЕРЖДЕНО»**

**ГУП "Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники"**

Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан

Просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию до того, как Вы начнете принимать лекарство. Она содержит важную для Вас информацию. Сохраните этот листок-вкладыш с информацией по применению, так как позднее Вам может потребоваться прочитать его еще раз. Для получения любой дополнительной информации или совета, пожалуйста, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту. Ваш врач выписал данный лекарственный препарат Вам лично. Вы не должны передавать его другим лицам. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания схожи с Вами.

RU

**Торговое название препарата: РИНОМАКС® ОКСИ КИДС
Действующее вещество (МНН): оксиметазолин**

Лекарственная форма: спрей назальный 0,025%

Состав:

100 мл раствора содержат:

**активное вещество: оксиметазолина гидрохлорид - 0,025%;
вспомогательные вещества: масло эвкалиптовое, натрия дигидрофосфат
дигидрат, динатрия эдэтат (трилон Б), бензаликский хлорид (в виде раствора
50%), пропиленгликоль, раствор соляной кислоты 0,1 М или раствор гидроксида
натрия 0,1 М, вода очищенная.**

Описание: прозрачный, бесцветный или со слегка желтоватым оттенком раствор со специфическим запахом эвкалиптового масла.

Фармакотерапевтическая группа: противоконгестивное средство -
вазоконстриктор (альфа-адреномиметик).

Код АТХ: R01AA05.

Фармакологические свойства

Альфа-адреномимитирующее средство для местного применения, оказывает сосудосуживающее и антиконгестивное действие. Оксиметазолин стимулирует α-адренорецепторы, вызывая сужение сосудов слизистых оболочек носа, придаточных пазух и евстахиевой трубы, что приводит к снижению их отека и облегчению носового дыхания при аллергическом или инфекционно-воспалительном рините (насморке).

Эвкалиптовое масло обладает бактерицидным, антивирусным и фунгицидным действием.

Фармакокинетика

При местном применении оксиметазолин в незначительной степени подвергается системной абсорбции, поэтому его концентрация в плазме крови незначительная. Действие проявляется через несколько минут. Продолжительность действия 10-12 часов.

Показания к применению

Для уменьшения отека слизистой оболочки носа, носоглottики и гайморовых пазух при:

- простудных заболеваниях (острый ринит);
- воспалении носовых пазух (острый синусит);
- евстахите;
- аллергическом рините (в т.ч. сенна лихорадка);
- среднем отите (в качестве средства вспомогательной терапии, т. к уменьшает отечность слизистой вокруг отверстия евстахиевой трубы).

Применяется также для облегчения осмотра или хирургических манипуляций в полости носа.

Информация о правильном применении

Способ применения и дозы

Всегда применяйте РИНОМАКС® ОКСИ КИДС точно в соответствии с инструкцией Вашего лечащего врача. Если Вы в чем-либо не уверены, спросите у Вашего врача или фармацевта.

Назальный спрей.

Детям от 3 до 6 лет - по 1 вспрыскиванию в каждый носовой ход 2 раза/сутки.

Не следует применять препарат чаще 2 раз/сутки.

Рекомендуется последнюю аппликацию проводить непосредственно перед сном.

Непосредственно перед применением препарата флакон нужно подержать в ладони, чтобы подогреть его до температуры тела. Перед введением препарата необходимо тщательно прочистить нос.

Перед первым применением назального спрея необходимо провести его «калибровку» путем нажатия на головку распылителя несколько раз. Для того чтобы правильно сделать вспрыскивание, следует держать распылитель вертикально, так, чтобы насадка была направлена вверх. Затем следует снять прозрачный предохранительный колпачок, поместить насадку в носовой ход, быстро резко надавить один раз на распылитель и вынуть из носового хода, не разжимая распылителя. Во время вспрыскивания следует вдохнуть немного воздуха через нос, что способствует оптимальному введению раствора.

При вспрыскивании не рекомендуется запрокидывать голову.

Продолжительность лечения: не рекомендуется применять препарат более 3-5 дней. Если симптомы усиливаются или улучшение не наступает в течение 3 дней, необходимо проконсультироваться с врачом.

Максимально допустимая продолжительность терапии – 5 дней. Препарат можно применять повторно только через несколько дней.

Побочные действия

Как и любой лекарственный препарат, РИНОМАКС® ОКСИ КИДС может вызывать побочные реакции, хотя они проявляются не у каждого.

Ниже указаны побочные эффекты, которые разделены по системно-органным классам в соответствии с классификацией Медицинского словаря по нормативно-правовой деятельности (MedDRA). Для указания частоты встречаемости побочных эффектов была использована классификация ВОЗ: очень часто ($\geq 10\%$), часто ($\geq 1\% < 10\%$), нечасто ($> 1\%$ и $\leq 1\%$), редко ($> 0,1\%$ и $\leq 1\%$), очень редко ($< 0,1\%$), неизвестная частота (по имеющимся данным определены частоты встречаемости побочного эффекта не представляется возможным).

Обычно РИНОМАКС® ОКСИ КИДС переносится хорошо. При частом и/или длительном применении препарата возможны:

- общие расстройства и нарушения в месте введения: возможно – экзантема; часто – жжение или сухость слизистой оболочки полости носа, чиханье, сильное чувство заполненности носа (реактивная гиперемия) после того, как пройдет эффект от применения препарата РИНОМАКС® ОКСИ КИДС, нарушение зрения (при попадании в глаза). Длительное непрерывное использование сосудосуживающих препаратов может привести к тахифилаксии, атрофии слизистой оболочки полости носа и возвратному отеку слизистой оболочки полости носа (медиаканальный ринит).
- со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто – повышение АД, тахикардия, возможно – ощущение сердебиения.
- со стороны нервной системы: редко – головная боль, бессонница; возможно – головокружение, чувство тревоги, раздражительность, нарушение сна (у детей).
- со стороны пищеварительной системы: возможно – тошнота.

Если у Вас отмечаются любые другие побочные реакции, не описанные в этом листке-вкладыше, пожалуйста, сообщите Вашему врачу или фармацевту.

Информация, необходимая до начала применения лекарственного средства

Противопоказания

Гиперчувствительность к препаратуре, в том числе к другим противоотечным средствам для интраназального применения; атрофический ринит; гипертрофия, воспаление слизистой носовых ходов без выделения сокрета, беременность,

лактация, одновременное применение ингибиторовmonoаминооксидазы (включая период 14 дней после их отмены), детский возраст до 3 лет.

С осторожностью: следует применять препарат при повышенном внутриглазном давлении, хронической почечной недостаточностью, аритмии, гиперплазии предстательной железы с клиническими симптомами (задержка мочи), закрытоугольной глаукоме, выраженным атеросклерозе, заболеваниях коронарных артерий, феохромоцитоме, хронической сердечной недостаточности, сахарном диабете, артериальной гипертензии.

Лекарственные взаимодействия

Пожалуйста, сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что Вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, даже если они отпускаются без рецепта.

При одновременном назначении препарата с другими сосудосуживающими средствами (независимо от способа введения) возможно взаимное усиление побочных эффектов.

Оксиметазолин замедляет всасывание местноанестезирующих средств и пропонирует их эффект.

При одновременном назначении ингибиторов МАО (включая период в течение 14 дней после их отмены) и трициклических антидепрессантов – повышение АД.

Особые указания

Следует избегать длительного применения и передозировки.

Пациентам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертонии, гипертрофозом препарат назначают с осторожностью.

Обычно при применении препарата РИНОМАКС® ОКСИ КИДС в рекомендованных дозах для ликвидации симптомов ринита достаточно 3 дней. Если за этот период симптомы не исчезнут, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

При продолжительном применении (более одной недели) возможно возобновление симптомов заложенности носа.

Максимально допустимая продолжительность терапии – 5 дней. Препарат можно применять повторно только через несколько дней.

Необходимо избегать попадания препарата в глаза.

Использование одного флакона несколькими лицами может привести к распространению инфекции. Флакон должен пользоваться только одно лицо (риск передачи инфекции).

Применение при нарушениях функции почек

Препарат следует применять с осторожностью при хронической почечной недостаточности.

Применение у детей

Следует избегать длительного использования и передозировки препарата у детей. Противопоказан в детском возрасте до 3 лет.

Применение в период беременности и грудного вскармливания

Если Вы обнаружите, что беременны во время применения препарата РИНОМАКС® ОКСИ КИДС, немедленно сообщите об этом Вашему врачу, так как только он может решить вопрос о необходимости продолжения лечения.

Безопасность препарата РИНОМАКС® ОКСИ КИДС у беременных женщин и в период лактации не установлена, поэтому препарат не рекомендуется применять беременным или в период лактации.

Возможно применение препарата РИНОМАКС® ОКСИ КИДС во время беременности и в период лактации по строгим показаниям только под постоянным врачебным контролем после тщательной оценки соотношения риска и пользы для матери и младенца. Не допускается превышать рекомендуемую дозировку.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

После длительного применения средств от насморка, содержащих оксиметазолин, в дозах, превышающих рекомендуемые, нельзя исключать общее влияние на сердечно-сосудистую систему и ЦНС. В этих случаях пациенты должны соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстрых психомоторных реакций. Препарат оказывает влияние на зрение, возможно снижение скорости реакции.

Передозировка

При приеме более высокой дозы, чем Вам назначено, немедленно обратитесь за помощью к врачу!

После значительной передозировки или случайного приема внутрь могут отмечаться такие симптомы: миоз, тошнота, рвота, цианоз, гипертермия, тахикардия, аритмия, сосудистая недостаточность, артериальная гипертензия, дыхательные расстройства, риск легких, остановка сердца. Кроме этого могут развиваться психические расстройства, а также угнетение функций ЦНС, которые сопровождаются сонливостью, снижением температуры тела, брадикардией, артериальной гипотензией, остановкой дыхания и возможным развитием комы.

Лечение: прекращение применения, симптоматическая терапия.

Форма выпуска

Спрей назальный 0,025% по 10, 15, 20 мл во флаконах с распылительным дозирующим устройством. Флакон с инструкцией при применению помещается в картонную упаковку.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C. Не замораживать.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Безрецепта.

Производитель:

Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственного средства

ООО «НИКА PHARM»

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 7 проезд ул. Сайрам, дом 48-А.

Тел: +(99871)1508668; факс: +(99871)1508448.

www.nikapharm.uz

NIKA PHARM
качество стало доступным

Отзывы и пожелания от потребителей по качеству лекарственной продукции и информацию о каких-либо побочных действиях или об отсутствии эффективности лекарственного средства просим направлять по следующему адресу или сообщать по телефону:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 7-проезд ул. Сайрам, дом 48-А.

+(998 71) 150-87-04
+(998 71) 150-87-05

info@nikapharm.uz

www.nikapharm.uz

RinoMaks®

**Oksi
Kids**

burun uchun sprey
Burundan nafas olishni yengillashtiradi
**ТИБИЁТДА ҚУЛЛАНИЛИШИГА
ДОИР ЙУРИҚНОМА**

3+

3 dan 6 yoshgacha
bo'lgan bolalar uchun



«ТАСДИҚЛАНГАН»

Ўзбекистон Республикаси Соглини саклаш вазирлиги хузуридаги
Фармацевтика тармогини ривожлантириш агентлигининг «Дори воситалари, тибий буюмлар ва тибий
техника экспертиси» ва стандартга шаштириши давлат маркази» ДУК

Мазкур қўллаш бўйича йўрикномани дори воситасини кабул қилишдан олдин диккат билан ўқиб чиқишингизни илтимос қиласиз. Унда Сиз учун муҳим маълумотлар мавжуд. Қўллаш бўйича матъумотни тутишиб ушбу варәк-киримтани сақлаб кўйин, чунки кейинчалик Сизда унчи яна бир бор ўқиб чиқиши зарурат тутгилиши мумкин. Илтимос, ҳар қандай кўшимча матъумот еки маслаҳатни олиш учун ўзингизнинг шифокорингиз ёки фармацевтичигизга мурожаат қилинг. Сизнинг шифокорингиз ўшбу дори воситасини шахсан Сизга тайналган. Уни Сиз бошقا шахсларга берманг. Препарат уларга зиёниятказиши мумкин, ҳатто уларнинг касаллик белgilari Сизнинг билан ўшша бўлса ўнга ўтсан.

UZ

Препаратнинг савдо номи: РИНОМАКС® ОКСИ КИДС
Таъсир этувчи модда (ХПН): оксиметазолин
Дори шакни: 0,025% низад спрея.

Таркиби:

100 мг эритма қуйидагиларни саклайди:
фоал модда: оксиметазолин гидрохорпориди, 0,025%;
ёрдамчи моддалар: эвкалпти мойи, натрый дигидрофосфат дигидрати, динатрий эдетат (трилон Б), бензапокин хlorиди (50% ли эритма кўринишидан), пропиленгликол, 0,1 М хлорид кислотаси эритмаси ёки 0,1 М натрый гидроксид эритмаси, тозалганг ан.

Таърифи: тиник, рангиз ёки он сарнирок тусли, ўзига хос эвкалпти мойи хидди эритма.

Фармакотерапевтик гурухи: деконгестант восита – вазоконстриктор (альфа-адреномиметик).

АТХ коди: R01AA05

Фармакологик хусусиятлари

Мажаллий қўллаш учун о-адреностимулатор восита, кон томирларни торайтируви юқумли алгилганиши ва антиконгестив таъсир кўрсатади. Оксиметазолин а-, а-адренорецепторларни рағбатлантиради, бурун шиплик кавати, бурун атрофи буспилларни вестахий нари кон томирларни торайтишини чакрири, алперик ва/еки инфиқсан-алгиланни ринит (тумов) да уларнинг шиншини пасайшига ба бурун билан нафас олишининг енгиллашишига олиб келади.

Эвкалпти мойи бактерицид, вирусларга қарши ва функциид таъсирларга эга.

Фармакокинетика

Мажаллий қўллашнинг аксиметазолин ахамиятсиз даражада тизимида сурилмаги учрайди, шунинг учун уни кон плазмасидаги концентрацияси кам. Таъсирни бир неча дақиқадан сўнг намоён бўлади. Таъсирининг давомийлиги 10-12 соат.

Кўллашниш

Бурун шиплик каватини, бурун-ҳалкум ва гаймор бўшликларидаги шинши камайтириш учун:
- шамопаша касалликларни (ўтири ринит);
- бурун бўшликларининг ялгилганишида (ўтири синусит);
- евстахийнда;
- алперик ринитда; (шу жумладан, пичан иситмасида);
- ўрта отитда (ўрдамч) даволаш воситаси сиратиди, чунки евстахий наининг тезшигина атрофидаги шиплик каватининг шиншини камайтиради) кўлланади. Шунингдек, бурун бўшлиянинг кўришини енгиллашириши учун ёки жаррохлик муоязларидан ҳам кўлланади.

Тўғри қўллаш ҳақида маълумот

Қўллаш усуси ва дозалари

Ҳар дойм РИНОМАКС® ОКСИ КИДС ни Сизнинг даволочи шифокорингиз таъсирларига анъан амал килган холда кўлланади. Азар Сиз нимадандир иккисинеңиз, ўзингизнинг шифокорингиз ёки фармацевтичигиздан сўрана.

Назад спрея.

Уч ўндан 6 ёнгача бўлган болаларда – ҳар бир бурун ўйлига бир мартадан суткада 2 маҳал пуркалади. Препаратни суткада 2 маҳалдан ортиқ кўллаш мумкин эмас.

Охири апликациянинг бевосита ухлашдан олдин амалга ошириш тавсия этилади.

Препаратни бевосита кўллашдан аввал флаконни тана ҳароратигача иситиб олиш учун кўнглифтади шубъл турни керак. Препаратни кўллашдан олдин бурунни кўнглифтади шубъл турни керак.

Назад спрея биринчи кўллашдан олдин пуркарга калпагни бир неча марта босиши орқали унинг «калиброяксасини» амала ошириши керак. Тўғри пуркарга учун пуркаргани вертикли тарзда шундай ушаша кераки, пуркарги нари юкорига каратиган бўйиши лозим. Сунгра шаффор химоя қалғони олиб, пуркарги наиний бурун ўйлига жойлаштириб, тез заксин рашада пуркаргани бир марта босиши ва босилган пуркарганин кўйиб юбормаган холда ўйлидан чиқарип олиш керак. Пуркаш вақтида бурун орхани бироз башни ютиши керак, бир эзитманин оптимал тарзи киритилиши ёдам беради. Пуркаш вақтида бушина орхага ташаша тавсия этилади.

Даёвонлишиш давомишиш: препаратни 3-5 кундан ортиқ кўллаш тавсия килинади. Азар 3 кун давомида белгилари кучайса ёки яхшиланиш кузатилмаса, шифорок билан маслаҳатлашши зарур.

Даёвонлишининг максимал рўҳсат этилган давомишиш – 5 кун. Препаратни кўтлаш фрактади бир неча кундан сўнг мумкин.

Нохчун таъсирлари

Ҳар қандай дори воситаси каби, РИНОМАКС® ОКСИ КИДС ҳам, ҳар бир истеммолгичда кузатилади, нохчун таъсирлар кечириши мумкин.

Кўйида меъброй-хуқуқий фолият бўйича. Тибий лугат таснифи билан мувоғиқ холда тизим-азотли синтезлар (MedDRA) бўйича бўлинган нохчун самаралар келитирилган. Нохчун самараларнинг учраш сонини кўрсатиш учун БЖССТ таснифлардан фойдаланади: жуда кўп ($\geq 10\%$), кўп ($\geq 1\%$ ва <10%), кўп эмас ($\leq 0.1\%$), кам ($\leq 0.01\%$ – <0.1%), жуда кам ($<0.01\%$), учраш сонини ноҳмалади (мажуд). Маълумотлар асоссида нохчун самараларнинг учраш тез-тезлигини аниқлашни иложи йўқ.

РИНОМАКС® ОКСИ КИДС одатда яхши ўзлаштирилди. Препаратни тез-тез ёки ўзок муддат кўлланади:

- умуми бузилишлар ва кўллашни жойдайди бузилишлар: эхитомил мавжуд – экантема: кўп – бурун бўшлиги шиплик каватининг аништириши ёки куриши, аксирли, РИНОМАКС® ОКСИ КИДС препаратни кўллашади самара ўтиб бўлганда сўнг кутилиб буриши битини хиссий (реактив гиперемия), кўришининг бузилиши (кўзга тушганди). Кон-томирларни торайтируви препаратларни узоқ муддат ва тўхтосиз кўллаш фиксиляси, бурун бўшлиги шиплик каватининг атрофисиги ва бурун бўшлиги шиплик каватининг қайтаршиши (дори воситалари чиқариган ринитта); олиб келиши мумкин.

- юрак томизи томонидан: кўп эмас – АБ нигр ортиши, тахикардия; эхитомил мавжуд: юрак куришинин сезизлини.

- нерв томизи томонидан: кам холларда: боз оғриги, уйқусизлик; эхитомил мавжуд – боз аланниши, хавотирлик хисси, таъсирчанлик, уйқунинг бузилиши (болаларда).

- оқкамат ҳамз кўниши томизи томонидан: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ўшбу йўрӯмукон-киримтада: эхитомил мавжуд – кўнгил айниши.

Азар Сизда ў